

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦИКАДЕРМА®

Регистрационный номер

Торговое наименование

Цикадерма®

Международное непатентованное или группировочное название

~

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения гомеопатическая

Состав (на 100 г)

активные компоненты:

вазелиновый экстракт из смеси трех видов свежих растений <i>Calendula officinalis</i> (календула официналис), <i>Hypericum perforatum</i> (гиперикум перфоратум), <i>Achillea millefolium</i> (ахилея миллефолиум) в соотношении 20:10:10	97 г
<i>Ledum palustre</i> МТ (ледум палюстре, матричная настойка)	1,5 г
<i>Pulsatilla</i> МТ (пульсатилла, матричная настойка)	1,5 г

Описание

Однородная мазь от жёлтого до жёлто-оранжевого цвета с характерным запахом

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав

Фармакокинетика

Не применимо

Показания к применению

Ожоги 1-2 степени, поверхностные раны (мелкие порезы, трещины, ссадины), укусы насекомых

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам, перечисленным в части 2, и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

Не наносить на слизистые оболочки, открытые и инфицированные раны, при мокнущем дерматите.

Возраст до 1 года в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Применение препарата в период беременности противопоказано (в связи с отсутствием клинических данных у данной категории пациентов)

Лактация

Применение препарата в период лактации возможно только по рекомендации врача

Способ применения и дозы

Наружно. Детям от 1 года и взрослым наносить мазь на предварительно обработанную рану 1-2 раза в день, в случае необходимости наложить повязку. Длительность применения не должна превышать 7 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами, применяемыми при данном заболевании

Особые указания

Не применять внутрь. При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостриться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Если после нескольких дней лечения улучшение не наступает или появляются побочные эффекты, следует проконсультироваться с врачом.

В период применения препарата следует избегать ультрафиолетового облучения.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения гомеопатическая. По 30 г в алюминиевую тубу, покрытую изнутри эпоксифенольным лаком, запечатанную алюминием, с завинчивающейся полиэтиленовой крышкой. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам «язычком».

Срок годности

3 года

Не применять по истечении срока годности

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С

Хранить в недоступном для детей месте

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Производитель

БУАРОН, 2, авеню де л'Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Место производства

2, авеню де л'Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Москва, ул. Долгоруковская, д.7

Тел. (495) 956 08 10,

факс (495) 956 08 14